

甘夏かあちゃんはブランド力の向上に取り組んでいます

平成27年産甘夏	平成27年 呼子夢甘夏及びゼリー原料の栽培管理概要表												安全・安心・美味																							
	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
甘夏柑収穫・販売																																				
若緑季ゼリー用																																				
フレッシュゼリー用																																				
最盛期ゼリー用																																				
ゼリー用(終盤)																																				
標準青果(産直用)																																				
木成り青果(産直用)																																				
地産地消(道の駅)																																				
年間全体	350a																																			
みかん美人	227袋																																			
施肥管理	原則、収穫完了後の園から												(反)10a												ケンタッキー 1.3 → 105袋											
元肥													みかん美人(JA) 6袋												太陽2号 1 → 35袋											
中肥													元肥												どなん 1 → 70袋											
秋肥													醗酵有機(総合)												ハイミクロ 0.7 → 50袋											
礼肥													追肥												JA堆肥 4 → 1500袋											
													夏肥												秋肥											
																									礼肥											
																									醗酵有機(P中心) 4.0 JA堆肥											
防除管理	多雨の年は約40~50日後に2回目を散布するが良い ※これ以降は散布禁止																																			
黒点病防除	収穫完了後の園からジマンダイセン水和(660倍)アピオン添加																																			
カイガラムシ防除	JAS規格農薬対象外品(物理的(窒息)防除)												アタックオイル180~150倍希釈濃度単体使用												カイガラムシの発生がある園のみ											
カメムシ防除	収穫期間中収穫完了までは、すべて化学農薬散布禁止																																			
																									テルスター水和剤											
																									基本的に年1回の散布											
除草	コンパカーレル 1回目																																			
蔓性、根茎、高伸性雑草	コンパカーレル (2回目)																																			
葉面散布	随時使用可能(農薬との混用は避けるが良い) 薬効分解 ※全てこの時期には使用しない方が良い																																			
H・カロチン	他資材は黒点病を誘発助長する懸念があるので注意を、(使用しない)																																			
ファーマン	原則単体使用(凝結しやすい)ただしH・カロチンとの混用はOK 収穫前の散布は効果的																																			
キトサン	混用散布																																			
環境管理																																				
堆肥投入																																				
草刈作業																																				
防風林管理																																				
改植																																				
新梢の剪定																																				

まとめ

佐賀県の特別栽培の認定基準(露地・中晩柑)				(除草剤2回を含む)	
化学農薬の使用回数	基準	6回以内	当園	5回	
化学窒素の使用kg数	基準	15kg以下	当園	8kg	

安心してご利用下さい。全国発送しています